

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень
на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме вибіркового санітарного рубок в насадженнях Карпатського
біосферного заповідника

08 серпня 2025 р.

м.Рахів

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Зоряною КРІЛИШИН, провідним інженером-лісопатологом відділу відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Ростиславом ФЕДАКОМ, в присутності в.о. заступника директора - головного природознавця Карпатського біосферного заповідника Романа КУЗЬМІНСЬКОГО, провідного наукового співробітника лісознавчої лабораторії Карпатського біосферного заповідника Дмитра СУХАРЮКА, провідного інженера відділу державної охорони ПЗФ Карпатського біосферного заповідника Ганни БАРАНЮК, за участю начальників ПНДВ проведено обстеження лісових насаджень з 28.07.2025р. по 08.08.2025р. на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі ПНДВ додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **95,1 га.**

Кевелівське ПНДВ

Квартал 5 , виділ 27 , площа 0,5 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром. На окремих деревах трутовики.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірково санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 2 , площа 0,8 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 11 , площа 1,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева з нахилом. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища (вітер) минулих років.

Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9 , виділ 14 , площа 1,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджені вітром. В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з підірваною кореневою системою та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 33 , площа 0,6 га.

Насадження поодинокі пошкоджені вітром. В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з підірваною кореневою системою та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13 , виділ 1 , площа 2,3 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими, кореневими гнилями та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева з нахилом та поламаними кронами внаслідок стихійного явища (вітер) минулих років. На окремих деревах трутовики.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 2 , площа 1,3 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 43 , площа 2,3 га.

Насадження пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з нахилом та поламаними кронами внаслідок стихійного явища (вітер) минулих років.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20 , виділ 39 , площа 0,9 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах

наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Наявні дерева з нахилом. На ділянці наявні поодинокі дерева із поламаними кронами внаслідок стихійного явища (вітер) минулих років.

Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Кузійське ПНДВ

Квартал 6 , виділ 19 , площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 3 , площа 0,4 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореновими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 10 , площа 0,2 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореновими гнилями.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 10 , площа 0,9 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок

їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром. Окремі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 14 , площа 0,9 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром. Окремі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Петрос-Говерлянське ПНДВ

Квартал 4 , виділ 20 , площа 1,4 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 2 , площа 1,7 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з стовбуровими гнилями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Рахів-Берлибаське ПНДВ

Квартал 1 , виділ 10 , площа 0,8 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 1 , виділ 15 , площа 0,2 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 16 , площа 2,9 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з підірваною кореневою системою та нахилом (IV-V категорії стану дерев). На ділянці наявні поодинокі дерева з поламаними кронами. Окремі дерева уражені стовбуровими гнилями.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 25 , площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з підірваною кореневою системою та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 27 , площа 0,3 га.

Насадження поодинокі пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження

гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 49 , площа 0,5 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з підірваною кореневою системою та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3 , виділ 8 , площа 0,1 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з підірваною кореневою системою та нахилом (IV-V категорії стану дерев). Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3 , виділ 19 , площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 3 , площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 20 , площа 0,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 21 , площа 0,3 га.

Насадження пошкоджені вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4 , виділ 24 , площа 0,3 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з поламаними кронами.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 27 , площа 0,4 га.

Насадження пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах

спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 44 , площа 0,4 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 47 , площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7 , виділ 1 , площа 1,2 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром. Окремі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7 , виділ 3 , площа 0,5 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом та з поламаними кронами внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 7, площа 0,3 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з стовбуровими гнилями та поламаними кронами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 26, площа 0,4 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 8, площа 0,6 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 25, площа 1,3 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореновими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром. Окремі дерева з трутовиками та поламаними кронами.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9 , виділ 36 , площа 1,1 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 8 , площа 0,8 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 9 , площа 2,9 га.

Насадження пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17 , виділ 3 , площа 0,6 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок

їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 6, площа 0,9 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 13, площа 1,9 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 18, площа 0,2 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 3, площа 0,3 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок

їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 4 , площа 0,7 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 13 , площа 1,3 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 14 , площа 0,1 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. На ділянці наявна вітровальна та вітроломна деревина.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 19 , площа 0,5 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом та поламаними кронами внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 29 , площа 0,6 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Угольське ПНДВ

Квартал 18 , виділ 12 , площа 2,1 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 25 , площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 27 , площа 1,5 га.

Насадження поодинокі пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з поламаними кронами.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 40 , площа 4,9 га.

В результаті обстеження виявлено процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими, кореневими гнилями та перестійністю насадження. На ділянці наявні поодинокі дерева з нахилом внаслідок пошкодження вітром.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24 , виділ 22 , площа 1,4 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев). Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 12 , площа 3,1 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26 , виділ 19 , площа 3,6 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев).

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 43 , площа 1,1 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з трутовиками.

Внаслідок даних уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Трибушанське ПНДВ

Квартал 1 , виділ 10 , площа 3,5 га.

Насадження пошкоджене вітром. В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок дерев з поламаними кронами та нахилом (IV-V категорії стану дерев). Окремі дерева поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1 , виділ 32 , площа 1,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 35 , площа 1,4 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Наявні дерева з стовбуровими гнилями. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 36 , площа 3,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожелтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з стовбуровими гнилями. На ділянці наявна вітровальна деревина.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2 , виділ 37 , площа 5,5 га.

Насадження пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожелтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева з стовбуровими гнилями. На ділянці наявна вітроломна деревина.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 19 , площа 1,0 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з некрозно-раковими хворобами. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8 , виділ 20 , площа 3,5 га.

В результаті обстеження виявлено поодинокі процеси деградації та розладнання деревостану, які супроводжуються відмиранням дерев за рахунок їх ураження стовбуровими та кореневими гнилями. На ділянці наявні поодинокі дерева з некрозно-раковими хворобами. Окремі дерева з нахилом.

Внаслідок даних уражень та пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Богдан-Петроське ПНДВ

Квартал 2 , виділ 12 , площа 0,7 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 1 , площа 1,2 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. На ділянці наявна вітроломна деревина.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 4 , площа 0,7 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева. Окремі дерева уражені стовбуровими гнилями. На ділянці наявні дерева з нахилом.

Внаслідок даних пошкоджень та уражень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Чорногірське ПНДВ

Квартал 10 , виділ 13 , площа 0,5 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 18 , площа 0,4 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 29 , площа 2,4 га.

Насадження поодинокі пошкоджені стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи та перестійністю насадження. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Марамороське ПНДВ

Квартал 4 , виділ 11 , площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 11 , виділ 9 , площа 3,8 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками. Причинами всихання дерев є їх заселення стовбуровими шкідниками, ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Такі дерева можуть стати потенційними для розвитку вогнищ стовбурових шкідників та їх поширення на інші – здорові дерева.

Внаслідок даних пошкоджень втрачається технічна якість деревини та створюються умови для поширення хвороб та розмноження шкідників лісу.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **95,1 га** при цьому виявлено:

Пошкодження вітром – 27,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 27,6 га;

Стовбурові шкідники – 44,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 44,0 га;

Стовбурові гнилі – 23,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 23,5 га;

2. Відведення дерев у вибіркові санітарні рубки провести за рахунок пошкоджених та уражених дерев (IV-VI категорії стану дерев).

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **95,1 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Згідно наказу №62 від 20.03.2017 року по Карпатському біосферному заповіднику « Про затвердження охоронних ділянок для рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин», затверджено перелік місць гніздування хижих птахів занесених до Червоної книги України, а саме чорного лелеки та токовищ глухарів і тетеруків. В усіх вище обстежених насадженнях місця гніздування відсутні.

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"




Зоряна КРІЛИШИН

Провідний інженер-лісопатолог
відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист"




Ростислав ФЕДАК

В.о. заступник директора-
головний природознавець
Карпатського біосферного заповідника



Роман КУЗЬМІНСЬКИЙ

Провідний науковий співробітник
лісознавчої лабораторії
Карпатського біосферного заповідника



Дмитро СУХАРЮК

Провідний інженер відділу
державної охорони ПЗФ



Ганна БАРАНЮК